

Epekő betegségek

Epekő betegségek

1. Epevezeték elzáródása

2. Epehólyaggyulladás

3. Epehólyaggyulladás

4. Epehólyaggyulladás

5. Epehólyaggyulladás

6. Epehólyaggyulladás

Epekő betegségek

Diagnózis:

UH, ERC (endoscopos retrograd cholangio cholecystographia)

EST (Fogarti katéterezés kő eltávolítás a choledohus-ból)

PTC (percutan transhepaticus cholangio cholecystographia)

Therápia: görcsoldók: No-Spa, Papaverin

Diéta: folyékony szénhidrát, fehérjedús

(zsíros étel, alkohol kerülés!)

Rohammentes időszakban: kőoldó Ursofalk, tiszta koleszterin

kő esetén

Műtét javasolt: több apró kő esetén

Acut cholecystitis

Tünetek: jobb bordaív alatti fájdalom, hidegrázás, láz, leukocytosis, magas süllyedés

Dg.: UH

Therápia: diéta, görcsoldók, antibiotikum (Ridol, Steralgint ne adjunk, mivel kodeint tartalmaz és Oddi-sphincter görcsöt okozhat)

Krónikus cholecystitis

Tünetek: jobb bordaív alatti fájdalom, hőemelkedés, láz,
leukocytosis, magas süllyedés

Dg.: UH

Therápia: diéta, görcsoldók, antibiotikum (Ridol, Steralgint ne adjunk, mivel kodeint tartalmaz és Oddi-sphincter görcsöt okozhat).

Cholagogumok: Bilagit

Acut heveny pancreatitis

Acut heveny pancreatitis

A hasnyálmirigy exocrin parenchymájának akut gyulladása

Előidéző okok: alkohol, epekő betegség, trauma, anyagcsere zavarok: hyperlipidaemia, hypercalcemia, haemochromatosis

Infekciók: vírusok, mumps, CMV, Coxackie, baktériumok

Gyógyszerek: Imuran, Furosemid

Acut heveny pancreatitis

Formája: oedemás-necrotisáló pancreatitis

Tünetek: köldök körüli fájdalom, hányinger, hányás, láz

Szisztémás elváltozások kísérhetik:

tüdő, vese

Lokális elváltozások:

pancreas tályog – pseudocysta, ascites, obstrukciós icterus

Laborvizsgálatok: Se, vizelet amyláz, se lipaze, vércukor emelkedés, egyéb gyulladásos tünetek (CRP)

Egyéb vizsgálatok: UH vizsgálat – CT, mellkas Rtg, nativ has felvétel

ERCP (Endoscopos Retrograd Cholangio Pancreotographia) + EST
(Endoscopoe Sphinctoromia) kő extrakció

Acut heveny pancreatitis

1. Therápia:

teljes koplalás, gyomorszonda levezetése, gyakori vérnyomás pulzus, centrális vénás nyomás mérés

2. Fájdalomcsillapítás: No-Spa, Papaverin. Algopyrin, epidurális kanül (fentanyl, marcaine) anesztézia

3. Folyadék és elektrolit rendezés, infúzió:

4. Komplikációk megelőzése, antibiotikum (oedemás formában nem kell, necrotisalo forma esetén UH vezérelte biopszia, bact tenyésztés, procalcitonin vizsgálat, bact gomba esetén emelkedik az érték)

5. Acut biliaris pancreatitis esetén 72 órán belül ERCP, EST, kő extrakció

6. Enterális táplálás necrotisalo AP esetén, probiotikumok adása

Sebészi kezelés: tályog infect. necrosis, perforáció a vékonybélben

Idült hasnyálmirigy gyulladás

Ok: krónikus alkohol fogyasztás, ismétlődő akut gyulladás

Betegség lényege: pancreas mirigyszövet helyén kötőszövet jelenik meg, emiatt csökken a pancreas exokrin működése, valamint az endokrin működése is.

Tünetek: fájdalom, hányinger, hányás, nagy térfogatú, világos színű, bűzös, kenőcsös küllemű széklet

Idült hasnyálmirigy gyulladás

Vizsgálatok: UH, ERCP, enzim vizsgálatok

Therápia: enzim pótlás